

Fingersvampar i ängsmark i Sverige - Det kan i ängsmark också kan dyka upp fingersvampar som mest hör hemma i skog. Som t.ex. granfingersvamp, anisfingersvamp och kamfingersvamp (sid 1 av 2)

#	Artnamn	Vetenskapligt namn	Färg	Förgrening	Växtsätt	Kännetecken	Lika arter
1	Svavelgul fingersvamp	Clavulinopsis fusiformis	gul	enkel	i knippe	växer i knippe, bitter smak	5,2,3,4
2	Hagfingersvamp	Clavulinopsis helvola	gul	enkel	spritt	ofta vit bas, kan ha bitter smak	3,4,1,5
3		Clavulinopsis laeticolor	gul	enkel	spritt el. i knippe	< 4 cm, mild smak	2,4,5
4	Aprikosfingersvamp	Clavulinopsis luteoalba	gulaprikos	enkel	spritt el. i knippe	aprikosfärgad, ibland ljus topp	2,3,5
5	Vridfingersvamp	Clavaria amoenoides	gul	enkel	spritt el. i knippe	störvuxen < 14 cm, matt blekgul tillplattade frk, foten är kort, otydlig o blek	1,2,3,4
6	Hedfingersvamp	Clavaria argillacea + var. Argillacea	gul	enkel	spritt el. i knippe	foten är mörkare än klubban, med ljungväxter på sur mark	7,9,2
7	Stråfingersvamp	Clavaria flavipes	gul	enkel	spritt	foten är mörkare än klubban, tunn (1,5-3,5 mm) jämntjock frk	8,6,9
8		Clavaria flavostellifera	gul	enkel	spritt	foten är ofta ljusare och genomskinligare än klubban	7,6,9
9		Clavaria sphagnicola	gul	enkel	spritt el. i knippe	i sphagnum, foten är ofta ljusare och genomskinligare än klubban	6,7,8
10	Maskfingersvamp	Clavaria fragilis	vit	enkel	spritt el. i knippe	större än nr 11, 2-10 cm, 2-5 mm bred, oftast otydlig övergång till fot	11
11	Opalfingersvamp sl.	Clavaria falcata s. lato	vit-beige	enkel	spritt , el kippe	tydlig markerad fot, 2-10 cm	12, 10, 13
12	Stjärnsporig fingersvamp	Clavaria asterospora (acuta)	vit	enkel	spritt el. i knippe	markerad fot, 1,5–3 cm hög, rent vit	11
13		Clavaria tenuipes	vit-beige	enkel	spritt el. i knippe	1-4 cm x 1-6 mm, tydligt klubbformad, trubbig , tydlig smal fot	11
14	Sotfingersvamp 1	Clavaria asperulisporea	svart	enkel	spritt el, 2-3 i knippe	något elastisk frk 3-8cm	15,18,16,17
15	Sotfingersvamp 2	Clavaria atrofusca	svart	enkel	spritt el, 2-3 i knippe	något elastisk frk 2-5 cm, tillplattad frk	14,18,16,17
16	Brun fingersvamp	Clavaria pullei	brun	enkel	spritt el. i knippe	frk brun-rödbrun, blekare i basen, < 5 cm, elastisk	17,14,15,17
17	"Brun fingersvamp 2"	Clavaria atroumbrina	brun	enkel	spritt el. i knippe	blekare i basen, < 4 cm, elastisk	16,14,15,17
18	"Askgrå fingersvamp"	Clavaria greletii	grå	enkel	spritt	svart-grå frk	14,15,16,17
19	Rökfingersvamp	Clavaria fumosa	blekbeigerosa	enkel	i knippe	skör frk, med säregen färg.4-10 cm hög	
20	Skär fingersvamp	Clavaria incarnata	gräddvit-rosa	enkel	spritt el. i knippe	blekt rosa, fot mörkare	21, 11
21	Rosenfingersvamp	Clavaria rosea	rosa	enkel	spritt	starkt rosa, otydlig fot	20
22	Violett fingersvamp	Clavaria zollingeri	lila	förgrenad	spritt	rätt stor o kraftig,	23
23	Violfingersvamp	Ramariopsis pulchella	lila	förgrenad		spinkig och 14–30 mm hög, ofta grenad tre ggr, med tydlig stam	22
24	Ängsfingersvamp	Clavulinopsis corniculata	gul	förgrenad	spritt el. i knippe	rent gul, 2-9 cm hög, smak mjöl eller bitter	33,25, 29,26
25	Saffransfingersvamp	Ramariopsis crocea	orange-gul	förgrenad	spritt	smakar mjöl, liten ofta < 2,5 cm	24,29,26
26		Ramariopsis citrina	gul	förgrenad	spritt	mycket spinkig, fint förgrenat, ljust citrongul med spetsiga fingrar	24,25
27		Ramariopsis subarctica	gul-beige	förgrenad	spritt el. i knippe	i kärr, 20–55 mm hög and 20–40 mm bred, blek fot gulare upptill	24
28		Ramariopsis luteoochracea	gul-beige	förgrenad		spinkig, fågrenad smutsvit till lädergul färg	33, 32, 29
29	Ljus ängsfingersvamp	Ramariopsis subtilis	vit - ljusbeige	förgrenad		vit eller gulvit, 2–4 cm hög, rikt förgrenad	24,33,34,28
30	"trubbfingersvamp"	Ramariopsis robusta	vit	förgrenad	i knippe	stor och kraftig, upp till 95 mm hög och 50 mm bred, vit till cremefärgad med många förgreningar från en ofta rätt tjock fot	31,34
31	Snövit fingersvamp	Ramariopsis kunzei s. lat.	vit	förgrenad		mellanstor, graciös, förgrenar sig från en rätt tunn fot	30,29
32	Broskfingersvamp	Clavulinopsis microspora (rufipes)	vit-beige	enkelt - förgrenad		<3 cm, rodnande fot på äldre frk. Få, plattade grenar eller ogrenad	33,28,29
33		Ramariopsis tenuicula	gräddvit-beige	förgrenad		liten, spinkig och fågrenad, Mindre och klenare än R.subtilis .	28,32,29
34	Gråbrun ängsfingersvamp	Clavulinopsis umbrinella s. lato	gråvit-beige	förgrenad		blekt grå-gråbrun, förgrenad fingersvamp, 2–3 (–5) cm hög	24,29,30,33,28

Fingersvampar i ängsmark i Sverige, Mikroskopiska kännetecken och en enkel nyckel!

#	Vetenskapligt namn	Söljor	Sporer
1	Clavulinopsis fusiformis	med söljor	runda släta, Q>1,2, 6,5-9 µm, stor apicus 1-2 µm
2	Clavulinopsis helvola	med söljor	knottriga, 5.2–6.7x4.3–5.7µm Q=1.09–1.3
3	Clavulinopsis laeticolor	med söljor	elipsoida, släta, 5.5-8 x 3.5-5.5µm, Q=1,1, stor apicus 1-2 µm
4	Clavulinopsis luteoalba	med söljor	elipsoida, släta, 4.5-8 x 2.5-4.5µm, Q>1,3
5	Clavaria amoenoides	ej söljor	släta elipsoida Q = [1.5 –] 1.7 – 2.1, sp 6 – 9.5 x 3 – 4.5 µm
6	Clavaria argillacea + var. Argillacea	med söljor	elipsoida, släta, Q=2,0-2,4 sp (8 –) 10 – 12 x 4 – 5 µm
7	Clavaria flavipes	med söljor	runda, släta 6–8(–9.2) x 5.5–7.5(–8) mm Q= 1,07-1,1
8	Clavaria flavostellifera	med söljor	elipsoida, 5–7.5(–8) x 4.5–6.0(–6.5) µm Q= 1,2-1,56
9	Clavaria sphagnicola	med söljor	elipsoida, släta, Q<2, 9-11,5 X 6-7
10	Clavaria fragilis	ej söljor	sp 4.5-6 x 3-4 µm
11	Clavaria falcata s. lato	med söljor	sp 7-9 x 5.5-7 µm
12	Clavaria asterospora (acuta)	ej söljor	ibland stjärnformiga, 7-9 x 5.5-7 µm
13	Clavaria tenuipes	med söljor	6,5-9,5 x 4-5,5 µm
14	Clavaria asperulispora	ej söljor	sp 3.5 – 4 x 3 – 4 µm runda m små vårtor, Q = 1.04–1.16
15	Clavaria atrofusca	ej söljor	(5.1)5.4–7.1(7.6) x (3.4)3.5–4.6(4.6) µm vårtiga , Qav = 1.61
16	Clavaria pullei	ej söljor	5,5-6,6 x 3-4 µmQ=1,8-2,2
17	Clavaria atroumbrina	ej söljor	släta 5 – 6.5 x 2.5 – 3.5 µm, Q = 1.74–1.88
18	Clavaria greletii	med söljor	stora runda 7.9 × 7.0 µm, Q = 1.13–1.20
19	Clavaria fumosa	ej söljor	sp släta droppformade 5,5-7 x 3-3,5
20	Clavaria incarnata	med söljor	6,5-10 x 3,5-6 µm (större än 20)
21	Clavaria rosea	ej söljor	5-8 x 2,5-3,5 µm (mindre än 18)
22	Clavaria zollingeri	ej söljor	5-6,5(-7,2) x 3,8-5,2 µm.
23	Ramariopsis pulchella	med söljor	(2.8–)3–4(–4.1) x (2.2–)2.3–3(–3.1) um, Q (1.15–)1.18–1.46(–1.51)
24	Clavulinopsis corniculata	med söljor	släta, Q 1–1.13 (4.6–)4.7–5.8(–6.2) x (4.3–)4.5–5.5(–5.9) µm
25	Ramariopsis crocea	med söljor	2.9–3.8 x 2.4–3.2 µm, Q=1.1–1.31
26	Ramariopsis citrina	med söljor	fint taggiga 3,5-4,5 x 2,8-3,3 µm
27	Ramariopsis subarctica	med söljor	5.5–7.0 x5.0–6.5 Q=1.0-1.1
28	Ramariopsis luteoochracea	med söljor	3,3-5 x 2,3-3 µm (Q gns. 1,5) släta eller med låga nästan osynliga vårtor
29	Ramariopsis subtilis	med söljor	ovala eller nästan runda, släta, 3-4.5 x 3-4µm
30	Ramariopsis robusta	med söljor	droppformade till runda m små piggar (3,5-)4-5,2 x 3,1-4,3 µm , Qav = 1,26
31	Ramariopsis kunzei s. lat.	med söljor	runda 3,5-5,5 x 3-5 med små, op til 0,7 µm höga piggar Qav = 1,15
32	Clavulinopsis microspora (rufipes)	med söljor	sp. släta 4-5 x 2,5-3 µm Q=1,37-1,52
33	Ramariopsis tenuicula	med söljor	fint taggade, 3-4,5(-5) x 3-3,5(-3,8) µm, Qav = 1,3
34	Clavulinopsis umbrinella s. lato	med söljor	släta, 5-7 x 4.5-6,5 µm.Q=1,0-1,1

(sid 2 av 2)

NYCKEL		
Enkel fruktkropp	på torr hedmark med ljungväxter = 6	
	på blötmark med vitmossa = 9	
	aprikosfärgad, små sporer utan tydlig apiculus = 4	
	fot tydligt avvikande från svampkroppen 7,8	runda sporer = 7
		elipsoida sporer = 8
	sporer taggiga/knottrig = 2	
	sporer släta, runda, klustrat växtsätt = 1	
	sporer släta, elipsoida 3, 5	Q > 1,6 klustrat växtsätt, vridna frk = 5
		Q < 1,6 tydlig apiculus = 3
	markerad fot 11,12,13	liten 1-3 cm, runda sporer, ibland med taggar = 12
Förgrenad fruktkropp	ej markerad fot 10	störvuxen 2-10 cm, runda sporer utan taggar=11
	frk blek, rökfärgad, klustrad = 19	liten, 1-4 cm, tydligt klubbformad, trubbig, avlånga sporer = 13
	frk annorlunda 14, 15, 16, 17, 18	stor upp t 15 cm, i ängsmark = 10
		sporer, tjockväggiga, vårtiga 14, 15 Q =1,64-1,81 (= 15)
		Q=1,04-1,16 (= 14)
		sporer,ej tjockväggiga, släta 17,19,36 Q =1,13-1,20 (= 18)
		Q =1,61-1,66 (= 16)
		Q =1,74-1,88 (= 17)
	fruktkropp blekt skär till kraftigt rosa 20, 21	frk blekt rosa, fot mörkare, sporer bredare än 3,5 µ = 20
		frk starkt rosa, fot oftast likfärgad, sporer smalare än 3,5 µm = 21
	Lila förgrenad fruktkropp 22,23	rätt stor o kraftig, stora sporer = 22
		spinkig, 14–30 mm hög, med tydlig stam små sporer = 23
	citrongul, gul el. gulorange 24,25,26	gul, smakar mjöl, släta sporer = 24
		livligt saffransgul, utan smak, fintaggiga sporer = 25
		ljus citrongul, mycket spinkig, fintaggiga sporer = 26
	blekgul - smutsvit, rikt förgrenad 27,29 (se 28,31,32)	blekt gul, i fjällen med mossor, Q=1.0-1.1 = 27
		vit eller gulvit, rikt förgrenad, sporer släta, 3-4.5 x 3-4µm = 29
		smutsvit till lädergul färg, spinkig, sporer släta 3,3-5 x 2,3-3 µm, Qav = 1.5 = 28
	småvuxna, blekgul - smutsvit, svagt förgrenad 28,32,33 (samtliga dåligt kända...) (se även 27, 29, 34)	rodnande fot på äldre frk. Få, plattade grenar eller oögnad, sporer släta 4-5 x 2,5-3 µm Q=1,37-1,52 = 32
		Sporer fint taggade, 3-4,5(-5) x 3-3,5(-3,8) µm, Qav = 1,3 = 33
	Vit - smutsvit frk 30,31 (se även 29!)	många förgreningar från en ofta rätt tjock fot = 30
		graciös, förgrenar sig från en rätt tunn fot = 31
	blekt grå-gråbrun frk. (se även 29) = 34	

Clavulinopsis med söljor, om förgrenad, släta sporer.

Ramariopsis frk förgrenade (med fintaggiga sporer vilket dock ibland enbart kan ses i mycket hög förstoring).

Clavulina har basidie med två hornlika sterigmata, stora runda sporer

Clavaria utan söljor, om förgrenad, släta sporer